

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/dzieciecy-temblak-am-sob-03-p-6454.html>



Dziecięcy temblak AM-SOB-03

Cena	80,00 zł
Numer katalogowy	AM-SOB-03
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Leczenie zwichnięcia łokcia polega na nastawieniu kończyny i unieruchomieniu jej w zgięciu w stawie łokciowym do 90 stopni w opatrunku gipsowym. U dzieci gips utrzymuje się 2 tygodnie, a następnie ręka poddawana jest rehabilitacji. Zarówno w trakcie noszenia opatrunku gipsowego jak i w okresie rehabilitacyjnym niezbędne jest stosowanie **profesjonalnego temblaka dziecięcego AM-SOB-03**.

SZCZEGÓLNE ZALETY

- **ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ**
- **24-GODZINNA TERAPIA** - orteza może być stosowana jako całodobowe unieruchomienie i stabilizacja stawu barkowego podczas wielu codziennych aktywności
- **WYRÓB MEDYCZNY KL. I** - produkt jest zarejestrowanym i opatentowanym wyrobem medycznym klasy I
- **DWUSTRONNOŚĆ** - orteza pasuje zarówno na prawe jak i lewe ramię
- **PZYJAZNY DLA SKÓRY**
- **EKOLOGICZNY**
- **ODDYCHAJĄCY**
- **INNOWACYJNY**
- **BAWEŁNA**

PRZEZNACZENIE

- zwichnięcie stawu łokciowego
- skręcenie stawu łokciowego
- urazy barku
- zwichnięcie barku
- skręcenie stawu ramiennego
- urazy obojczyka
- złamania w obrębie kości ramiennej, łokciowej i przedramienia
- konieczność pourazowego i pooperacyjnego unieruchomienia barku, ramienia, łokcia i przedramienia
- uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie kończyny górnej wymagające unieruchomienia (stłuczenia, infekcje)

CZYM JEST ZWICHNIĘCIE STAWU ŁOKCIOWEGO?

Zwichnięcia stawu łokciowego to najczęstsze zwichnięcia występujące w obrębie kończyny górnej, bo stanowią aż 25% wszystkich tego typu urazów. Czasem towarzyszą im złamania kości przedramienia. Do zwichnięcia łokcia zazwyczaj dochodzi na skutek wystąpienia mechanizmu pośredniego takiego jak upadek na wystosowaną kończynę. Wówczas kość łokciowa przemieszcza się, najczęściej do tyłu, względem kości ramienia.

Leczenie zwichnięcia łokcia polega na nastawieniu kończyny i unieruchomieniu jej w zgięciu w stawie łokciowym do 90 stopni w opatrunku gipsowym. U dzieci gips utrzymuje się 2 tygodnie, a następnie ręka poddawana jest rehabilitacji. Zarówno w trakcie noszenia opatrunku gipsowego jak i w okresie rehabilitacyjnym niezbędne jest stosowanie **profesjonalnego temblaka dziecięcego AM-SOB-03**.

JAK DZIAŁA TEMBLAK DZIECIĘCY AM-SOB-03?

Nasz dziecięcy bark AM-SOB-03 doskonale unieruchamia kończynę górną po urazie. Jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku stosowania opatrunku gipsowego jak i w celu stabilizacji samej kończyny. Dzięki swojemu anatomicznemu ukształtowaniu, temblak utrzymuje staw łokciowy w zgięciu pod kątem 90 stopni, co zapewnia funkcjonalną terapeutyczną pozycję w okresie rekonwalescencji.

Temblak został wykonany z najwyższej jakości przewiewnych i oddychających materiałów, dzięki czemu zapewnia utrzymanie optymalnej higieny skóry Twojego dziecka.

Temblak AM-SOB-03 posiada pas barkowy, który zapewnia optymalne utrzymanie kończyny w pozycji funkcjonalnej i nie obciąża kręgow szyjnych, w odróżnieniu od tradycyjnych opatrunków.

Temblak posiada również innowacyjną konstrukcję, w której specjalny pas tułowia otacza tułów zapewnia prawidłowe przyleganie kończyny do tułowia. Takie rozwiązanie ustawia kość łokciową, ramienną i bark w pozycji neutralnej i zapobiega możliwości odwiedzenia kończyny. Dzięki temu, orteza zapewnia komfortowe warunki dla prawidłowego leczenia urazów w obrębie łokcia, ramienia i barku.

Uchwyt kciuka, zastosowany w temblaku, stanowi dodatkowy punkt stabilizujący kończynę. Pozwala na wygodne ułożenie dłoni dziecka i uniemożliwia jej przesuwaniu się do przodu. Ponadto, takie ułożenie dłoni zapobiega jej opadaniu i zapewnia przyjęcie neutralnej pozycji stawu nadgarstka.

TABELA ROZMIAROWA

Rozmiar	Długość A
1	18-24 cm
2	24,5-30 cm
3	30,5-36 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3